

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi suntik dengan siklus menstruasi di wilayah BPS “Kenny” Jodipan pada bulan Januari-Maret 2019. Hal itu dibuktikan dengan nilai Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000 < 0,05 dan koefisien korelasi sebesar 0,929, maka tingkat hubungan antara kedua variable tersebut dikatakan sangat kuat.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan

1. Mempelajari tentang kelebihan & kekurangan penggunaan alat kontrasepsi serta efek sampingnya.
2. Selalu memberikan KIE kepada akseptor KB tentang macam macam KB serta efek sampingnya sehingga akseptor dapat memakai alat kontrasepsi secara efektif.

5.2.2 Bagi akseptor KB

1. Diharapkan akseptor KB mengetahui terlebih dahulu tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan alat kontrasepsi serta efek sampingnya agar dapat memilih alat kontrasepsi yang tepat.
2. Selalu memantau perubahan efek samping sehingga apabila ada kelainan dapat segera diatasi.

5.2.3 Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya perlu dikembangkan lebih lanjut penelitian ini dan lebih menekankan lagi pada persiapan pengambilan data dengan teknik wawancara untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan diharapkan bisa mengembangkan lagi kuesioner dan lebih menyempurnakan penelitian ini sehingga akan lebih baik.