

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian kajian farmasetik dan klinis dapat disimpulkan bahwa masih ada sedikit ketidaksesuaian pada kajian farmasetik yaitu terdapat 8 lembar resep (8 %) terjadi duplikasi pengobatan. Obat yang mengalami duplikasi tersebut adalah domperidone + metoclopramide yang merupakan obat antiemetik golongan antagonis domapine, dan duplikasi glimepiride + gliquidone yang merupakan obat antidiabetes tipe 2 golongan sulfonilurea yang apabila di gabungkan dalam 1 resep maka akan mengalami hipoglikemia. Ada banyak ketidaksesuaian Pada kajian klinis yaitu terdapat 47 lembar resep (47 %) terjadi interaksi obat yang terdiri dari tingkat keparahan minor, moderate dan mayor serta terdiri dari mekanisme interaksi farmakodinamik, farmakokinetik, dan tidak diketahui. Terdapat 15 lembar resep (15 %) terjadi polifarmasi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu dilakukan lagi penelitian lebih lanjut yang hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan evaluasi dan menetapkan kebijakan terkait kajian farmasetik dan klinis di Rumah Sakit Prima Husada Malang.