

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian didapatkan data demografi pasien paling banyak yaitu umur 1-9 tahun dengan 146 pasien (55,51%), dan jenis kelamin paling banyak laki-laki yaitu sebanyak 157 pasien (56,69%).
2. Dari hasil penelitian didapatkan paling banyak untuk terapi pengobatan ISPA yaitu dengan menggunakan golongan mukolitik sebanyak 62 pasien (23,57%).
3. Dari hasil penelitian didapatkan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan yaitu 109 resep sirup dengan presentase 41,4%, sebanyak 93 resep tablet dengan presentase 35,4% dan 15 resep nebulizer sebanyak 15 resep dengan presentase 5,7%.
4. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa obat mengalami interaksi yaitu ciprofloxacin dan vitamin k1 sebanyak 1 resep (0,38%), dexamethasone dan ciprofloxacin sebanyak 1 resep (0,38%), mefenamic acid dan dexamethasone sebanyak 2 resep (0,76%) paling banyak Ibuprofen dan dexamethasone sebanyak 3 resep (1,27%).

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pasien

Hal-hal yang dapat disarankan untuk pasien adalah sebagai berikut.

1. Pasien sebaiknya memperbaiki lingkungan dengan fasilitas yang ada sehingga memperkecil risiko terjadinya ISPA.

2. Pasien sebaiknya lebih memperhatikan pola hidup sehat misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga.

5.2.2 Saran untuk TTK

Hal-hal yang dapat disarankan untuk TTK adalah sebagai berikut.

1. TTK sebaiknya lebih sering berkomunikasi kepada dokter penulis resep agar meminimalkan pemberian resep untuk obat yang dapat berinteraksi.
2. TTK sebaiknya lebih menambah wawasan tentang obat-obat yang dapat berinteraksi.