

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Obat antibiotik yang diresepkan pada ISPA anak di Instalasi farmasi Rumah Sakit Lavalette Malang meliputi golongan Sefalosporin (Cefixime , cefadroxil) sebanyak 76% dan golongan Penisillin (amoxicillin) 22 % serta golongan makrolida (Azithromycin) dengan jumlah 2%.
2. Obat antibiotik yang diberikan untuk ketepatan dosis ISPA anak sesuai dengan usia dan berat badan pada obat Cefixime yang diresepkan 10 % dosis berlebih , obat amoxicillin 8% dosis tepat, obat cefadroxil 10 % dosis berlebih dan obat azithromycin 2% dosis kurang.
3. Lama pemberian obat antibiotik untuk ISPA anak meliputi cefixime sebanyak 33% tepat dan 2% tidak tepat , Amoxicillin 15% tepat , Cefadroxil 47% tepat dan azithromycin 2% tepat .

5.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan ketepatan dalam menentukan terapi dan dosis yang sesuai dengan pasien anak-anak untuk menghindari ketidaksesuaian dalam pelaksanaan terapi khususnya antibiotik.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan alat ukur resep tetapi juga menggunakan data rekam medis dengan diagnose yang lengkap.